

TERIFLUNOMID UDDANNELSES- OG DISKUSSIONSGUIDE TIL SUNDHEDSPERSONALE

DISKUSSION

- Diskuter følgende risici med patienten/forælderen/omsorgspersonen, forklar overvågningskravene og fortæl dem, hvad de skal gøre, hvis patienten oplever specifikke tegn eller symptomer.
- Læs venligst produktresuméet for en udførlig produktbeskrivelse.

Risiko for hæmatologisk påvirkning

- Risiko for fald i antallet af blodlegemer (påvirker hovedsageligt hvide blodlegemer).
- Udfør komplet blodtælling før behandlingen påbegyndes og efterfølgende ved behov baseret på kliniske tegn og symptomer under behandlingen.

Risiko for hypertension

- Kontroller blodtrykket før behandlingen påbegyndes og derefter med jævne mellemrum under behandlingen.
- Blodtryksstigning bør håndteres hensigtsmæssigt før og under behandlingen.

Patientens navn:		Patientens alder:	
Dato for første besøg:		Patientens køn: <input type="checkbox"/> Mand <input type="checkbox"/> Kvinde	
Dato for første ordination:		Dags dato:	

Risiko for leverpåvirkning

- Kontroller leverfunktionen før behandlingen påbegyndes og periodisk under behandlingen.
- Rådgiv patienten om symptomer og tegn på leverpåvirkning og informer vedkommende om straks at kontakte lægen, hvis nogen af disse udvikler sig.

Risiko for alvorlige infektioner

- Informer patienten om straks at kontakte lægen, hvis han/hun har udviklet tegn eller symptomer på en infektion.
- Informer patienten om, at han/hun også skal informere lægen, hvis han/hun får ordineret eller tager anden medicin, der påvirker immunsystemet.
- Overvej en accelereret eliminationsprocedure ved tilfælde af alvorlig infektion.

Risiko for teratogenicitet

- Informer kvinder i den fødedygtige alder om, at teriflunomid kan forårsage alvorlige fødselsdefekter og det derfor er kontraindiceret under graviditet. Kvinder i den fødedygtige alder bør endvidere informeres om brug af effektiv prævention under og efter behandling med teriflunomid, indtil deres teriflunomid-blodniveauer er lave. Kvinder bør straks kontakte deres læge, hvis de planlægger at blive gravide, stoppe eller skifte prævention i denne periode.
- Kontroller potentialet for graviditet hos alle kvindelige patienter før- og under behandlingen, herunder patienter under 18 år.
- Informer kvindelige patienter om, at de skal stoppe med at tage teriflunomid og straks kontakte deres læge, hvis de bliver gravide på trods af anvendelse af kontraception. Lægen vil derefter overveje og drøfte den accelererede eliminationsprocedure med kvinden.
- Fortæl forældre/omsorgspersoner til piger, at de skal kontakte pigens læge for rådgivning om risikoen for teratogenicitet og prævention, når hun begynder at menstruere.

Patientkort:

- Giv patienten et patientkort og diskuter løbende indholdet ved hver konsultation. **Så længe patienten er under behandling, bør indholdet diskuteres mindst en gang om året.**
- Udfyld dine kontaktoplysninger på patientkortet og opdater det ved behov.
- Råd patienten til at fremvise dette kort til enhver læge eller sundhedsperson, der er involveret i behandlingen (f.eks. i tilfælde af en nødsituation).
- Råd patienten til at kontakte sin ordinerende- eller praktiserende læge, hvis de udvikler tegn eller symptomer på de risici, der er beskrevet i patientkortet.
- Før behandlingen skal kvinder i den fødedygtige alder, herunder unge og deres forældre/omsorgspersoner, rådgives og informeres om den potentielle risiko for fosteret. Derefter skal rådgivningen foregå regelmæssigt under behandlingen.
- Sørg for tilstrækkelig overvågning af patienter, når nye recepter udstedes, herunder bivirkningskontrol, risikovurdering og forebyggelse.

Patienten er blevet informeret om og forstår de ovennævnte risici og fordele, der er forbundet med denne behandling.

Ordinerende læges navn:

Ordinerende læges signatur:

Dette uddannelsesmateriale indeholder vigtig sikkerhedsinformation om Teriflunomide Mylan (teriflunomid) og rådgivning om risikominimering.

Denne brochure er udviklet af Viatrix ApS.

Indberetning af formodede bivirkninger efter godkendelsen af lægemidlet er vigtigt. Det muliggør fortsat overvågning af benefit/riskforholdet for lægemidlet.

Sundhedspersonale bedes indberette alle formodede bivirkninger via www.meldenbivirkning.dk.

Teriflunomid diskussionsguide, Dansk version 1.0
Godkendt af Lægemiddelstyrelsen 06-Jun-2023

VEILEDNING