

Balancid Novum (calciumcarbonat 449 mg + magnesiumhydroxid 104 mg) tyggetabletter

Virkning: Balancid Novum bruges mod for meget mavesyre, sår i tolvfingertarmen, mavesår og sure opstød. **Dosering:** *Voksne:* 1-2 tyggetabletter tygges omhyggeligt ved behov efter et måltid. Ved mavesår kan der anvendes 1-3 tyggetabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sovetid. Tabletter tygges grundigt, og det er ikke nødvendigt at skylle efter med vand. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. **Kontraindikationer:** Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. **Særlige advarsler og forsigtighedsregler:** Må ikke anvendes uden ordination fra lægen ved nedsat nyrefunktion eller ved arvelig fructoseintolerans. Balancid Novum indeholder 94,1 mg sorbitol pr. tablet. Længere tids brug kan forstyrre kalk- og fosfatbalancen. Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af smertestillende medicin eller gigtmicin sammen med Balancid Novum. **Interaktioner:** Kan påvirke optagelsen og effekten af andre lægemidler. Spørg lægen eller på apoteket hvis du bruger andre lægemidler. **Graviditet og amning:** Kan anvendes. **Bivirkninger:** *Almindelige:* Forstoppelse eller diarré. *Sjælden:* Svær og alvorlig tilstoppelse af tarmen ved brug af meget høje doser. *Meget sjælden:* Alvorlige bivirkninger kan forekomme hos personer med nedsat nyrefunktion. *Ikke kendt frekvens:* Mavesmerter.

Læs indlægssedlen omhyggeligt inden brug af dette lægemiddel.

Pakningsstørrelser: 30 og 100 stk. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Viatrix ApS. Produktinformationen er baseret på seneste godkendte produktresumé dateret oktober 2021.

Opdateret 23-05-2023