

Produktinformation

Medilax® 667 mg/ml lactulose oral opløsning

Indikationer: Behandling af kronisk forstoppelse. Forebyggelse og behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt.

Dosering*: Børn 0-5 måneder: 3-6 ml dagligt fordelt på 2 doser. Børn 5-12 måneder: 10 ml daglig fordelt på 1-2 doser. Børn 1-14 år: 5-15 ml daglig fordelt på 1-2 doser. Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Voksne og børn over 14 år: 15-30 ml daglig. Dosis er individuel og bør justeres til en halvfast afføring opnås

Advarsler og forsigtighedsregler*: Må ikke bruges ved blokeret tarmpassage, perforation i fordøjelsessystemet, blindtarmsbetændelse, galactoseintolerans eller overfølsomhed over for indholdsstofferne. Høje doseringer (100-150 ml daglig) kan øge insulinbehovet hos diabetikere. Må ikke anvendes af personer på galactose- eller laktosefri diæt.

Graviditet og amning: Kan anvendes.

Bivirkninger: *Meget almindelige:* i starten af behandlingen kan ses lette mavesmerter, oppustet mave, afgang af luft fra tarmen, diarré. *Almindelige:* kvalme, opkastning. *Undersøgelser:* ubalance i kroppens saltindhold pga. diarré.

Pakninger: 100 ml, 250 ml, 500 ml og 1000 ml. **Dagsaktuelle priser:** Ingen fast pris.

Udlevering: HF. **Læs indlægssedlen grundigt inden brug.**

*Forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, dateret 18. oktober 2021, som kan rekvireres vederlagsfrit fra indehaveren af markedsføringstilladelsen: Viatris ApS, Borupvang 1, 2750 Ballerup, Danmark.