

Moxalole® pulver til oral opløsning (macrogol 3350, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat og kaliumchlorid).

Virkning: Behandling af kronisk forstoppelse. Opløsning af hård og indeklemmt afføring i ende- og tyktarmen, som er konstateret af lægen ved en undersøgelse. **Dosering:** Mod forstoppelse: Voksne: 1 brev 1-3 gange dagligt. For de fleste er 1-2 breve om dagen nok. Hvis symptomerne fortsætter efter 2 uger, skal du kontakte din læge. Bør ikke anvendes til børn under 12 år. Mod hård og indeklemmt afføring, som din læge har konstateret ved undersøgelse: Voksne: 8 breve dagligt indtaget over 6 timer. Behandlingen varer normalt ikke længere end 3 dage. For patienter med nedsat hjerte-kar-funktion bør dosis fordeles således, at der ikke gives mere end 2 breve i timen.

Tag ikke Moxalole hvis du er overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Hvis du har en tilstopning i tarmen, hul i tarmen, tarmslyng, toksisk megacolon (sygelig stor, udspilet tyktarm med ansamling af tarmindehold) eller ved alvorlig betændelse i tarmen som bl.a. colitis ulcerosa og Morbus Crohn. **Advarsler og forsigtighedsregler:** Tal med lægen eller sundhedspersonale inden du anvender Moxalole. Når du tager Moxalole skal du fortsætte med at drikke meget vand. Hvis du føler dig svag, stakåndet, er meget tørstig med hovedpine, har hjertesvigt eller får opsvulmede ankler, skal du stoppe med at tage Moxalole og kontakte din læge med det samme. Indeholder 187 mg natrium (hovedkomponenten i madlavning/bordsalt) i hvert brev. **Interaktioner:** Kan påvirke optagelsen og effekten af andre lægemidler. Spørg lægen eller på apoteket hvis du bruger andre lægemidler. **Graviditet og amning:** Kan anvendes. **Bivirkninger:** *Meget almindelige:* Mavesmerter og mavekramper, diarré, opkastning, kvalme, maverumlen og luftafgang fra tarmen. *Almindelige:* Kløe, hovedpine, hævede fødder, ankler og hænder. *Ikke almindelige:* Udslæt, sure opstød, halsbrand og oppustethed. *Meget sjældne:* Allergiske reaktioner. Forstyrrelser i elektrolytniveau, især for kalium. Ubehag ved endetarmsåbningen.

Pakningsstørrelser: 8 stk., 20 stk., 50 stk. og 100 stk.

Læs grundigt oplysningerne i indlægssedlen inden brug af dette lægemiddel.

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Viatris ApS, Borupvang 1, Ballerup. Baseret på seneste godkendte produktinformation dateret september 2023.