

**Mucomyst®** 200 mg acetylcystein brusetabletter.

**Virkning:** Mucomyst er et slimløsende hostemiddel, som virker ved at opløse sejt slim i luftvejene, så det bliver nemmere at hoste op. **Dosering:** *Voksne:* 1 brusetablet opløst i ½ glas vand 3 gange daglig. *Børn over 5 år:* 1 brusetablet opløst i ½ glas vand 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 5 år uden lægens anvisning. **Advarsler og forsigtighedsregler:** Anvendes med forsigtighed hvis du har eller har haft astma, sammentrækninger i luftvejene eller mavesår. Må ikke anvendes, hvis du hoster blod op eller er overfølsom overfor et eller flere af indholdsstofferne. **Mucomyst indeholder natrium og lactose:** 1 brusetablet indeholder 99,26 mg natrium svarende til 5 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. **Interaktioner:** Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, bør du kontakte din læge, da Mucomyst kan øge virkningen af den blodfortyndende medicin. Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. **Graviditet og amning:** Hvis du er gravid eller ammer, må du kun tage Mucomyst efter aftale med lægen. **Bivirkninger:** *Meget almindelige:* Kvalme, diarré. *Ikke almindelige:* Alvorlig åndenød, mavesmerter. *Sjældne:* Udslæt, kløe, nældefeber. Alvorlige allergiske reaktioner, kan være livstruende.

**Læs indlægssedlen omhyggeligt inden brug af dette lægemiddel.**

**Pakningsstørrelser:** 25 stk. **Dagsaktuelle priser:** Uden fast pris. **Udlevering:** HF.

**Tilskudsstatus:** Ingen. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Viatris ApS, Borupvang 1, 2750 Ballerup, tlf. +45 28 11 69 32.

Revideret på baggrund af det godkendte produktresumé, dateret 18. oktober 2021.

Opdateret 25-maj-2023. Dækker både paragraf 5 og paragraf 11.